

INSTRUCCIÓN SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LA VACUNA MEN C POR MEN ACWY EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA DE CANTABRIA

Se establece la sustitución de la vacuna frente a meningococo monovalente C por la vacuna conjugada tetravalente frente a los serogrupos A, C, W y Y (Men ACWY) en el calendario de vacunación infantil y en los calendarios acelerados con el fin de ampliar la protección frente a estos serogrupos, simplificar la logística y responder a la evolución epidemiológica de la enfermedad meningocócica invasora.

Pautas de vacunación:

- 1. Niños y niñas de 4 y 12 meses de edad:**
 - Se sustituye la vacuna Men C por Men ACWY.
 - La administración se realizará según la pauta de dos dosis: 4 meses y 12 meses.
 - Este cambio se aplicará a partir del **1 de febrero de 2026** a los niños/niñas que vayan cumpliendo 4 y 12 meses.
- 2. Dosis de recuerdo:**
 - Se mantiene la dosis de refuerzo a los 12 años con la misma vacuna Men ACWY.
- 3. Situación de los niños previamente vacunados con MenC.**
 - Los niños que hayan recibido previamente vacunación frente a meningococo del serogrupo C (MenC), conforme al calendario vacunal vigente en el momento de su administración, se considerarán correctamente vacunados y no está indicada la administración de dosis adicionales de vacuna MenACWY como pauta correctora ni de rescate.

La sustitución de la vacuna MenC por MenACWY se aplicará únicamente a las dosis administradas a partir de la entrada en vigor de la presente instrucción, sin que proceda la revisión ni modificación de pautas vacunales ya completadas o iniciadas correctamente.

La vacuna frente a meningococo ACWY empleada por el Sistema Sanitario Público de Cantabria es el NIMENRIX® (lab. PFIZER) única vacuna autorizada por la AEMPS para su administración a partir de las 6 semanas de edad.

Nimenrix puede administrarse a la vez que otras vacunas indicadas para estas edades, pero en diferente lugar de inyección. Nimenrix es una vacuna frente a meningococo de 4 serogrupos conjugada con toxoide tetánico por lo que a la hora de administrar junto a otras vacunas que contengan toxoide tetánico se debe administrar a la vez o al menos un mes antes que otras vacunas que contengan toxoide tetánico en su composición.

Para obtener más información sobre Nimenrix® consulta su ficha técnica en:

<https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>

Santander, a fecha de la firma electrónica

Luis Javier Viloria Raymundo

Jefe de Servicio de Salud Pública

